



CORTICOÏDES ANTI-INFLAMMATOIRES STÉROIDIEN

D.C.I: PREDNISOLONE

INDICATIONS : -Anti-inflammatoire stéroidien

Pathologies se manifestant par des poussées inflammatoires
 Comprimés 20 mg
 Boîtes de 20 comprimés effervescents
 Comprimés 5 mg
 Boîtes de 30 comprimés effervescents





SYSTÈME RESPIRATOIRE

D.C.I: SALBUTAMOL

INDICATIONS: Traitement symptomatique de la crise d'asthme et de la bronchite chronique obstructive.

- Prévention de l'asthme d'effort.
- Bronchiolite chez l'enfant et le nourrisson

 Comprimé 2 mg Boîtes de 40 • Suppositoire 1 mg Boîtes de 12 Aérosol 100µg/dose 200 doses Solution buyable Flacon 150 ml







INDICATIONS: Traitement symptomatique des toux sèches non productives.

- Prévention de l'asthme d'effort.
- Bronchiolite chez l'enfant et le nourrisson
 - Flacon 180 ml Sirop adulte

D.C.I: BICLOTYMOL + PHOLCODINE + MALÉATE DE CHLORPHÉNAMINE, GUAÏFÉNÉSINE + PARACÉTAMOL

- **INDICATIONS:** Antiseptique des voies respiratoires (Biclothymol). - Traitement symptomatique des toux non productives.
- Rhinipharyngites Laryngites.
 Sirop (adultes enfants)

Flacons 200 ml

• Suppositoire (adultes - enfants) Boîte de 6 Boîte de 20 Comprimé adulte



D.C.I: CARBOCYSTÈINE

INDICATIONS : - Bronchites aiguës et chroniques

- Bronchorrées Catarrhs tubaires
 - Sirop adulte Carbocistèine 5% Flacons 125 ml et 300 ml
 - Sirop enfant Carbocistèine 2% Flacons 125 ml













ANTIMYCOSIQUES ET DERMATOLOGIE



DOUCIA Plus®

FITEX®

FONDERMA®

D.C.I: FLUCONAZOLE

INDICATIONS : - Candidoses vaginales aiguës et chroniques

- Onychomycoses - Pytiriasis versicolor - Intertigo - Trichophyties cutanées

• Gélule 50 mg Boîte de 7

• Gélule 150 ma Boîte de 1 et 4

D.C.I: OXYDE DE ZINC + VITAMINES A ET D + BAUME DE PÉROU

INDICATIONS : - Candidoses vaginales aiguës et chroniques

- Erythème fessier, érythème solaire - Gerçures des seins.

- Brûlures, ulcérations cutanées - Hémorroïdes, fissures anales.

 Pommade dermique Tube 30 et 65 q

D.C.I: TERBINAFINE

INDICATIONS: - Onychomycoses - Pytiriasis versicolor - Intertrigo

- Trichophyties cutanées - Pied d'athlète/

• Comprimé 250 mg Boîtes de 14 et 28

• Comprimé 250 mg Boîtes de 14 et 28

• Crème 1% Tube de 20 g

D.C.I: ZINC PYRITHIONE

INDICATIONS : - Onychomycoses - Pytiriasis versicolor - Intertrigo - Trichophyties cutanées - Pied d'sthlète.

• Solution 1 a Flacon 60 ml

• Emulsion à,5 q









Pommade H.E.C.

D.C.I: TANIN + HAMAMÉLIS + PHÉNAZONE

INDICATIONS : - Traitement local d'appoint des brûlures superficielles de faible étendue.

- Rhinologie : traitement local d'appoint au cours des épistaxis
- Plaies cicatricielles
- Circoncision

• Pommade - Tanin à l'éther 12,5 q Tube 25 q

- Hamamélis 0,75 g

- Phénazone 0,75 g







ANTALGIQUES - ANTIPYRÉTIQUES - ANTI-INFLAMMATOIRES

CETAMYL





D.C.I : PARACÉTAMOL

INDICATIONS : - Douleurs et fièvre.

 Comprimé effervescent 1g 	Boîte de 8
 Comprimé effervescent 500 mg 	Boîte de 16
Comprimé sécable 1g	Boîte de 10
Comprimé sécable 500 ma	Boîte de 20

 Comprime secable 200 mg
 Sachets: 500mg 300mg 200mg 150mg 100mg Boîte de 12 Boîte de 10 Suppositoires: 500mg 300mg 200mg 150mg 100mg • Sirop pédiatrique 3% Flacon 90 ml













D.C.I : PARACÉTAMOL + CODEINE + CAFÉINE

INDICATIONS: - Douleurs aiguës et mdérées, céphalées, migraines, douleurs dentaires, entorse..

 Comprimé effervescent 	Boîte de 16
 Comprimé effervescent 	Boîte de 24
Comprimé sécable	Boîte de 20







INDICATIONS : - Etats inflammatoires traumatiques, arthrose, polyarthrite rhumatoïde, inflammations de la sphère ORL, douleurs et inflammations articulaires.

• • •			. ^ =	Boîte de 3
(a ma m m m a	gastrorésistant	5() ma	at 1/2 man	
	MACIFARECTANI	111111111111111111111111111111111111111		BOILE OF 3
	quali oi calaiuii	O III G		Done de o

• Ampoule injectable 75 mg Boîte de 2 et 5 ampoules • Gel 1% usage externe















D.C.I: SALICYLATE DE MÉTHYLE + CAMPHRE + MENTHOL

INDICATIONS: - Douleurs et inflammations musculaires et articulaires, massages sportifs

• Crème usage externe pour 100 g

Tube 55 g

- Salicylate de méthyle 12,50 g





INDICATIONS : - Douleurs diverses, fièvre, états inflammatoires

Suspension buvable à 2 g / 100 ml

Flacon de 150 ml







SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE

APRIL[®]

ENZYCARD®

LODIPINE®

SISTEROL®

D.C.I: ENALAPRIL MALÉATE
INDICATIONS: - Hypertension artérielle
- Insuffisance cardiaque
- Dysfonctionnement du ventricule gauche

 Comprimé 10 mg 	Boîte de 30
• Comprimé 5 mg	Boîte de 30
• Comprimé 2,5 mg	Boîte de 30

D.C.I: PAMIPRIL

INDICATIONS : - Hypertension artérielle - Traitement post-infactus associé à une insuffisance cardiaque

 Comprimé 10 mg 	Boîte de 30
• Comprimé 5 mg	Boîte de 30
• Comprimé 2.5 ma	Boîte de 30

D.C.I: AMLODIPINE

INDICATIONS : - Hypertension artérielle

- Prévention des crises d'angor

Comprimé 5 mg	Boîte de 14
Comprimé 5 mg	Boîte de 28
Comprimé 10 mg	Boîte de 14
Comprimé 10 mg	Boîte de 28

D.C.I: SIMVASTATINE

INDICATIONS : - Hypercholestérolémies pures ou mixtes

 Comprimé 40 mg 	Boîtes de 30 et 60
 Comprimé 20 mg 	Boîtes de 30 et 60











ANTIVIRAUX, TRAITEMENT DE L'HÉPATITE B & C

CEPAVIR®

DACLAR® 60 mg

ISOF® 400 mg

D.C.I: RIBAVIRINE

INDICATIONS: - Hépatologie

Comprimé 200 mg	Boîtes de 56,84 & 168
Comprimé 400 mg	Boîtes de 56,84 & 168
Comprimé 500 mg	Boîtes de 56,84 & 168
 Comprimé 600 mg 	Boîtes de 56,84 & 168



D.C.I: DACLATASVIR

INDICATIONS : - Hépatite C chronique (HVC)
• Comprimé pelliculé 60 mg

Boîte de 28



D.C.I: SOFOSBUVIR

INDICATIONS : - Hépatite C chronique (HVC)Comprimé pelliculé 400 mg

Boîts de 28







SOFOSDAC®

D.C.I: TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE

INDICATIONS : - Hépatite B

- Infection parLE VIH

• Comprimé pelliculé 300 mg

Boîte de 30

D.C.I: SOFOSBUVIR / DACLATASVIR **INDICATIONS : -** Hépatite C chronique

• Comprimé pelliculé 4 00 mg / 60 mg

Boîte de 28

HBVIR 300 mg

SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL

BEVIRAN[®]

COLISPASM®

COLOPATHIL®

D.C.I: MÉBÉVÉRINE CHLORHYDRATE

INDICATIONS: - Spasmes intestinaux lors des troubles fonctionnels intestinaux

Dyspepsies - Traitement des spasmes et douleurs intestinaux.
Comprimé pelliculé 200 mg

Boîte de 30

Comprimé pelliculé 100 mg

Boîte de 30



INDICATIONS: - Antispasmodique - Traitement symptomatique des douleurs liée aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires - Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës

des voies urinaires : coliques néphrétiques.

• Comprimé orodispersible 80 mg Boîte de 20

D.C.I: ATTAPULGITE ACTIVÉE

INDICATIONS: - Colopathie fonctionnelle - Pansement intestinal notamment en cas de côlon irritable - Traitement symptomatique des colopathies aiguës et chroniques eventuellement accompagnées de diarrhées de météorisme

- Diarrhées aiguës et chroniques

• Sachet (adulte) attapulgite activée 3 g

Boîte de 30

• Sachet (pédiatrique) attapulgite activée 1,5 g











SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL

GASTROGEL®

IPP®

LACTULAX®

D.C.I: HYDROXYDE D'ALUMIMIUM ET DE MAGNÉSIUM

INDICATIONS : - Traitement symptomatique de l'hyperacidité et des brûlures gastriques éventuellement accompagnées de douleurs, de ballonnements ou de reflux gastræsophagien.

Boîte de 40

Flacon 250 m





D.C.I: OMÉPRAZOLE

INDICATIONS : - Ulcère gastro-duodénal - Reflux gastro-æsophagien

- Œsophagite peptique Dyspepsie fonctionnelle Gastrite Eradication d'Hélicobacter pylori Syndrôle de Zollinger-Ellisson
- Adjuvant aux A.I.N.S
 - Gélule 20 mg renfermant microgranules gastro-résistants



Boîtes de 7, 14,28 et 56

D.C.I: LACTULOSE

INDICATIONS : - Traitement symptomatique de constipation

- Encéphalopathie hépatique
 Solution buvable 50g / 100ml





SYSTÈME GASTRO-INTESTINAL

MEPRAMIDE®

MORIDIL®

PYROSIX ®

ROXID®

D.C.I: BROMOPRIDE

INDICATIONS : - Nausées et vomissements d'origine diverses

- Troubles de la motricité gatsrique Reflux gatsro-œsophagien et bilio-gatsrique
- Dyspepsies, flatulences et météorisme

• Comprimé 10 mg Boîte de 20 • Soluté buvable 0,1 % Flacon de 125 ml • Gouttes pédiatriques 0,1 % Flacon de 60 ml • Gélules 10 mg Boîte de 20



MORIDIL*

D.C.I: CARRAGHENATE + DIOXYDE DE TITANE + LIDOCAÏNE + OXYDE DE ZINC

INDICATIONS : - Traitement symptomatique des manifestations douloureuses et prurigineuses anales, en particulier dans la crise hémoroïdaie

Carraghenate 2,5 g • Pommade :

Dioxyde de titane 2 q

Lidocaïne 2 g

Oxyde de zinc 2 g Tube 20 g

• Suppositoire : Carraghenate300 mg

Dioxyde de titane 200 mg

Oxyde de zinc 400 mg Boîte de 12



INDICATIONS: - Reflux gastro-æsophagien - Aogreurs d'estomac

• Bicarbonate de sodium 2,670g/100ml Flacon 250 ml



D.C.I: NIFUROXAZIDE (ANTIBACTÉRIEN INTESTINAL)

INDICATIONS : - Diarrhées aiguës d'origine bactérienne en l'absence de phénomènes invasifs.

• Gélule 200 mg Boîtes de 18 et 30 • Gélule 100 mg Boîtes de 18 et 30 • Suspension buvable 4% Flacon de 90 ml





ANTIBIOTIQUES ET ANTI-INFECTIEUX

D.C.I: AZITHROMYCINE

INDICATIONS: - Infections respiratoires hautes et basses

- Infections ORL (angines, otites, sinusites)
- Infections uro-génitales

 Comprimé pelliculé 500 mg Boite de 3 • Gélule 250 mg Boite de 6 • Poudre pour suspension pédiatrique 200 mg / 5 ml Flacon de 15 ml

• Poudre pour suspension pédiatrique 200 mg / 5 ml Flacon de 30 ml



BIOTIC PLUS®

AZ[®]

D.C.I: AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE - RAPPORT 8/1

INDICATIONS : - Infections et surinfections des voies respiratoires hautes et basses

- Infections ORL (angines, otites, sinusites)
- Infections dermatologiques et uro-génitales
- Infections et prophylaxie en stomatologie

Sachet 1 g/ 125 mg

Boîtes de 12, 14, 16 & 24

• Sachet 500 mg/ 62,50 mg • Poudre pour suspension enfant 100 mg - 12,5 mg / ml

Boîtes de 12, 14, 16 & 24 Flacon de 60 ml

• Poudre pour suspension nourrisson 100 mg - 12,5 mg /2 ml Flacon de 60 ml

BIOTIC*PLUS

D.C.I: CLARITHROMYCINE

INDICATIONS: - Infections ORL

- Infections respiratoires hautes et basses
- Eradication d'Hélicobacter pylori
 - Comprimé pelliculé 500 mg Boite de 14 Comprimé pelliculé 250 mg Boite de 14





ANTIBIOTIQUES ET ANTI-INFECTIEUX

METROZAL®

PENISTAPH®

D.C.I: MÉTRONIDAZOLE

INDICATIONS: - Parasitoses intestinales (giardiase, amibiase)

- Trichomonase vaginale, vaginoses bactériennes
- Infections à germes anaérobies
- Eradication de l'hélicobacter pylori dans le cadre du traitement séquentiel concimitant
 - Comprimé pelliculé 500 mg

Comprimé pelliculé 250 mg

• Suspension buvable 4%

Boite de 20 Boite de 20

Flacon de 120 ml



D.C.I: AMOXICILLINE

INDICATIONS: - Infections et surinfections des voies respiratoires hautes et basses

- Infections ORL (otite moyenne aiguë, angine streptococcique)
- Infections des voies respiratoires hautes et basses
- Eradication d'Hélicobacter pylori
 - Comprimé dispersible 1 q

Boîtes de 12, 14 & 24 Comprimé dispersible 500 mg Boîtes de 12 & 24

- Poudre pour suspension buvable 500 mg 250mg 125mg/ 5ml flacon de 60 ml
- Poudre pour suspension buvable 500 mg 250mg 125mg/ 5ml flacon de 100 ml

D.C.I: FLUCLOXACILLINE

INDICATIONS: - Infections staphylococciques

- Infectionsde la peau et des tissus mous : furoncles, abcès, folliculites, antharax
 - Gélule 500 mg

Boite de 12, 16 & 24

- Poudre pour suspension orale à 125 mg / 5ml Flacon de 60 ml & 100 ml
- Poudre pour suspension orale à 250 mg / 5ml Flacon de 60 ml



METROZAL® 500 mg











ANTIBIOTIQUES ET ANTI-INFECTIEUX

PROFLOX®

TRISULFA®

D.C.I: CIPROFLOXACINE

INDICATIONS: - Infections urinaires et génitales
- Infections ORL (sinusites chroniques)
- Infections ophtalmologiques
- Infections de l'os et des tissus mous

- - Comprimé pelliculé 500 mg Boites de 10 & 20
 - Comprimé pelliculé 250 mg Boites de 10 & 20



D.C.I: SULFAMÉTHOXAZOLE + TRIMÉTHOPRIME INDICATIONS: - Infections uro-génitales - Infections ORL (sinusites chroniques) - Infections digestives, fièvre typhoïde

 Infections à pneumocystis carinii
 Comprimé fort 800 mg - 160 mg
 Comprimé fort 400 mg - 80 mg Boîte de 20 Boîte de 20 Suspension (200 mg - 40 mg) / 5ml Flacon de 100 ml







RHUMES - GRIPPE - REFROIDISSEMENTS - RHINOPHARYNGITES



EPHEDRYL[®]

RHUMIX ®

TRIRHUM®

D.C.I : PARACÉTAMOL + CAFÉINE + PROMÉTHAZINE

INDICATIONS: - Douleurs, Fièvre, Céphalées, Refroidissements, États grippaux.

• Comprimé sécable : - Paracétamol 400 mg

- Caféine 25 mg

- Prométhazine 5 mg Boîtes de 2



D.C.I: PARACÉTAMOL + TRIPLORIDINE + PSEUDOÈPHÉDRINE

INDICATIONS : - Traitement symptomatique des états grippaux

- Rhinite allergiques - Rhinopharyngites.

• Comprimé sécable : Boîtes de 20 Paracétamol 300mg - Triploridine 2,50mg - Pseudoèphédrine 50mg

• Solution buvable : Flacon 100 ml

Paracétamol 2500mg - Triploridine 25mg -Pseudoèphédrine 500mg

D.C.I : PARACÉTAMOL + PSEUDOÈPHÉDRINE + IBUPROFÈNE + VITAMINE C + CAFÉINE
INDICATIONS : -Traitement symptomatique des états grippaux - Rhinites allergiques

Rhinopharyngites, Refroidissements, Fièvre.

• Sachet : - Paracétamol 400 mg - Pseudoèphédrine 50 mg - Ibuprofène200mg - Acide ascorbique 300mg - Caféine Boîte de 10



D.C.I : PARACÉTAMOL + VITAMINE C + PHÉNIRAMINE MALÉATE

INDICATIONS: - Etats grippaux - Rhume - Rhinite - Rhinopharyngite - Maux de têteou Fièvre

- Écoulement nasal clair Larmoiements Eternuements
 - Sachet adulte : Paracétamol 0,500 g Vitamine C 0,200 g Phéniramine maléate 0,025 g
 - Sachet adulte sans sucre

 Boîte de 8
 - Sachet enfant : Paracétamol 0,280 g Vitamine C 0,100 g Phéniramine maléate 0,010 g
 - Sachet enfant ans sucre Boîte de 8



VITAMINE C 1g

D.C.I: ACIDE ASCORBIQUE

INDICATIONS: - Immunostimulant, anti-radicaux libre, antiathénique

- Traitement des carences en vitamine C (scorbut°
- Asthénie et fatigue passagères de l'adulte, convalescence
- Surmenage physique
 - Comprimé effervescent : vitamine C 1g
 Comprimé effervescent : vitamine C 1a
 Boîte de 10
 Boîte de 20



ANTIHISTAMINIQUES - ANTI-H1

APETINE[®]

ERGIC®

HISTAC®

D.C.I: CYPROHEPTADINE

INDICATIONS: - Antihistamine H1 contre les manifestations allergiques et prurigineuses

- Stimulant de l'appétit en cas d'anorexie
- Maigreur due à l'anorexie

 Comprimé 4 mg Boîte de 30 & 90 Flacon de 125 ml • sirop 2 mg / 5 ml



D.C.I: DESLORATADINE

INDICATIONS: - Rhinite allergique

- Urticaire
- Conjonctivite allergique

• Comprimé pelliculé sécable 5 mg Boîte de 7, 14 & 30 Flacon 60 ml

Solution buvable 0,5 mg / ml



D.C.I : CÉTIRIZINE

INDICATIONS: - Rhinite allergique

- Urticaire
- Conjonctivite allergique

• Comprimé pelliculé sécable 10 mg Boîte de 7 & 15



PERNABOL®

PERVITAL®

D.C.I: CYPROHEPTADINE

INDICATIONS: - Antihistaminique H1 contre les manifestations allergiques et prurigineuses

- Stimulant de l'appétit en cas d'anorexie
- Maigreur due à l'anorexie

• Comprimé 4 mg • Sirop 2 mg / 5 ml

Boîtes de 3 & 90 Flacon de 125 ml



D.C.I: CYPROHEPTADINE + VITAMINES + LYSINE

INDICATIONS: - Anorexie carentielles

- Asthénies, convalescence
- Maigreur constitutionnelle
- Instabilité émotionnelle s'accompagnant d'anorexie
- Hypovitaminoses B1, B2,B3, B6, PP et C.

• Comprimé : - Cyproheptadine 4 mg - Thiamine 12,5 mg

- Pyridoxine 10 mg - Nicotinamide 50 mg

- Acide ascorbique 150 mg - Riboflavine 5 mg

: - Cyproheptadine 0,080 mg - Thiamine 0,020 mg Flacon de 125 ml

- Pyridoxine 0,020 mg - Nicotinamide 0,100 mg - Acide ascorbique 1g - L-lysine monochlorhydrate 3g



Boîte de 20

SYSTÈME MÉTABOLIQUE ET HORMONAL D.C.I: METFORMINE INDICATIONS : - Diabète non insulinodépendant (TYPE II) • Comprimé pelliculé 500 mg • Comprimé pelliculé 850 mg Boîtes d Boîte de 50 Boîtes de 30 & 60 DIABYL® D.C.I: GLICLAZIDE **INDICATIONS :** - Diabète non insulinodépendant (TYPE II) • Comprimé 80 mg Boîtes de 20 & 60 **GLYAZID**[®] D.C.I: ALLOPURINOL INDICATIONS : - Traitement de la goutte : goutte tophacée, arthropathie - Traitement des hyperuraturies **GLYAZID**® - Traitement et prévention de la lithiase urique • Comprimé 100 mg Boîte de 50

